

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]](#)[CollectionBoite_044_A-31-chem | Alexander. La médecine psychosomatique. Item](#)[Hypertension](#)

Hypertension

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0635

SourceBoite_044_A-31-chem | Alexander. La médecine psychosomatique.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Hyperlension

Définition organique :

- Coaction des artérioles sur l'acte élastique du système vasculaire.

- On trouve var^u des lésions de gros vaisseaux ou des artérioles; var^u aussi des hypertrophies du ventricule gauche.

- On peut lier + l'art^u à l'art^u vaso-moteur général, hypothèse confirmée par le fait que les hyperlensions coexistent avec l'hyperlension.

- (a) des situations variées de l'art^u
- (b) à des stimuli organiques (inimers-
sion de la main et peau froide)

- Quant à ce dernier lien, il rend dû

(a) soit à l'acte d'impulsion des vaso-moteurs sur les muscles lisses des artérioles

(b) soit à l'existence de certains le long (ex la rénine, agent chimique dérivant de la glande de la t^u, et qui provoque l'ischémie de la réine)

Ces substances toxiques seraient des agents de continuelle excitation neurogène des vaisseaux rénaux.

BnF
MSS

380
- Ceci est compris par la ↓ de la pr. sang. chez
des hypertendus, par le blocage des ganglions
autonomes par le chlorure de tétréthylammonium
(T.E.A.C.)

La yogenèse

- Cannon a montré que la peur et la colère
activent les fonctions du S.N. sympathique
et la sécrétion de l'adrénaline

- ~~cependant~~ "l'inhibition des instincts
agressifs qui sont très associés à l'anxiété
influençant grandement le niveau de la tension
artérielle". Chez les hypertendus "incapables
d'extérioriser leur impulsions agressives"
(p. 131)

- Les hypertendus sont des inhibés nerveux, avec
des pulsions : "et ils cèdent à leur besoin de
des pulsions, et font de plus en plus leurs réac-
tions hostiles dirigées contre ceux qui les soumettent"

- Des lentes offrent d'agressivité chez les individus
se stimulant et se bloquant mutuellement, en-
trainant une sorte de pratique affective

- qd on laisse la tension artérielle, le caractère
devient + moussu :

Alexander. (ind. yogenèse)