

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-21-chem | Philosophie de la Nature. Geoffroy Saint-Hilaire. Item](#)[Le type idéal du sternum](#)

Le type idéal du sternum

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0556

SourceBoite_045-21-chem | Philosophie de la Nature. Geoffroy Saint-Hilaire.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Le type idéal du sternum.

"Le sternum est un nom collectif pour un
pièces. chacune d'elle a un "caractère déterminé
de sa fonction propre." 132

- "Faisant preuve d'individualité, et d'activité
écarter de la nature, quoiqu'il n'y d'individue,
les pièces s'élèvent au rang de matériaux pour
de l'organe, et doivent recevoir des noms distincts."

(132-3)

- "A la pièce antérieure est l'os impaire l'oblique
l'os de porter la clavicule pectorale ; à la 2^e
de rendre le ni service à la clavicule coracoïde
La 3^e et la 4^e ... ont 2 os en courant
les ni hautes, 2 os en bas, exposés aux arêtes,
in brisant ou disparaissant ensemble," 133.

BnF
MSS

- La 9^e pièce du sternum, souvent en 2
qd la poitrine est étroite ; elle est accouplée
2 et 2 et en série, qd elle est large. (134)

- "On est ainsi conduit à un type
idéal de sternum par les vertèbres, lequel
ensuite, en s'élevant de moins en moins, s'élève

« ne peuvent former secondaires, s/ que
« peuvent employer la totalité ou le
+ part des matériaux constituant ou n' que
viennent à changer leur dimension, ou
proportion répétitive.

La condition de diversité, qd elle-ci est
repermeable à de certaines limites sont de
la éternité des stérnum corrigés "
(135)

- Quelle que soit la microscopie, "il
est x difficile d'en déceler la diversité,
d'apercevoir qu'elle se convertissant en une,
à la suite, d'en contraindre à la x c/2, et
de la ramener à une seule mesure, à des
lois d'isotopie et enfin à un seul et
un type" (137)

Φ aux . I.

1818.