

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]CollectionBoite_044_A-34-chem | Psychologie du caractère. Item\[Les composantes de base de la morphologie \(suite\)\]](#)

[Les composantes de base de la morphologie (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0665

SourceBoite_044_A-34-chem | Psychologie du caractère.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Sheldon, William](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

échelle de 7 points. $\pm$ minimum de 12
mesures de diamètres et $\pm$ écart prédominances
 $\pm$ somatotype. 665

Le somatotype est $\pm$ série de 3 nombres,
chacun exprimant l'importance de chacune
des 3 composantes (endo, meso, ectomorphie).

Les somatotypes extrêmes sont 117, 711,
et 171; le somatotype moyen (sur échelle,
mais non pas la distribution de fréquence) est 444

4/ Les somatotypes

- Prédominance de l'endomorphie : viscères
digestifs massifs ; structures somatiques fortes ;
~~graisse~~ spécifique faible. ~~Peu~~ souvent gros, mais
parfois aussi emaciés.

- Prédominance de la méso-morphie : les structures so-
matiques sont en équilibre (os, muscles, tissu de
conjonction). Poids spécifique élevé ; viscères
sanguins larges

- Prédominance de l'ectomorphie : fragilité, linéarité,
étroitesse de la poitrine ; extrémités peu musclées,
proportion à la main, grande surface exposée au
monde extérieur. Biologique l'ectomorphie
est extrême, et l'endomorphie inversée.

à less que χ^2 , cest le cas habit.

Les chang^{mt} ^{ab} a lin en bires peut modifier
les mesures qui r^{es}ultent le somato type, mais
celui-ci peut encore être reconnu, et jamais
un chang^{mt} ^{ab} a lin en bires ne pouvant pure
changer le somato type (le somatotype demeure
malgré des chang^{mt} ^{ab} de poids de biens d^{es} autres
de kg)

5/ Il y a aussi des facteurs secondaires : la
dysplasie, la gynecomorphie, le "caract^{er}
nétique m^uable" (qui sont le r^{es}ultat de p^{er}mutations
ou sont hérit^{er}es des composants primaires),
pigmentation.

Sheldon (constitutional factors in
Personality)
in Hum p 538-541.