

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]](#)[CollectionBoite_044_A-35-chem | La psychologie animale. Item](#)[La \[dominance\] et la névrose chez les animaux](#)

La [dominance] et la névrose chez les animaux

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0679

SourceBoite_044_A-35-chem | La psychologie animale.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

La dominance et la nervosité chez les
animaux.

679

Paul Siver (1943) : 16 chats dressés
individuellement à prendre 1 bouteille de nourriture
après 1 signal. en 4 groupes par 4.

Dans chaque groupe, un g et le + actif et le
+ alerte devient dominant, prend la nourriture;
les autres tentent d'essayer de prendre la
nourriture, malgré des coups de dents.

Dans des cas assez rares, certains chats dominent
ensemble et l'autre chat le dominant, garde
l'ordre, mais ils ne prennent pas la nourriture.

La dominance est très stable.

- Près de la nourriture la renverse en renversant
nervosité de l'animal dominant. Il
est alors dominé, et attaque à
la fois d'agression les autres dominants.

BnF
MSS

Mallerman (Pa. n
pp 134.5)

