

Instincts et taxies selon Lorenz

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0682

SourceBoite_044_A-35-chem | La psychologie animale.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées

- [Guillaume, Paul](#)
- [Lorenz, Konrad](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Instincts et taxis / Lorenz.

682

Lorenz distingue instincts et taxis bien
reconnaissant leur unité et en plus

A La distinction:

- Les taxis sont les mécanismes g^x d'orientation de la réaction par les stimuli externes.
- l'acte instinctif a sa forme complexe et spécifique en rend indépendant et indépendant
a l'acte proprement dit

(1) est l'automatisme de l'excitabilité variable à son rythme propre

(2) à mesure que l'excitabilité π , l'indétermination du stimulus efface π .

(3) à la limite l'acte pourrait s'accomplir de lui-même, sans stimulus et son objet.

B L'union et la hiérarchie de comportements.

Le comportement observable d'un animal résulte de la superposition à l'acte instinctif de taxis par laquelle il s'adapte aux propriétés variables des objets réels.

E_x : la cane qui court, apercevant l'oeuf près de son nid, se fixe, tend le cou dans la direction, se tève, - puis par l'un des mouvements

du bec le ramène entre ses pattes, et
le pénétrant et le nid

② sont des hix : l'orientation de la tête
et du cou, le mouvement paterne du bec rempli
chez l'oeuf de médier

③ un acte du mouvement du bec est acte un acte
hif autonome, puisque :

- il se déroule à vide si l'oeuf a
roulé de côté

- il ne s'adapte ni à la grandeur, ni
au poids de l'oeuf qu'on peut y succéder

(d'après Guillaume. Yannick
pp 128. 129)