

Expériences de Bethe

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0683

SourceBoite_044_A-35-chem | La psychologie animale.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Expériences de Beke

"Le vieil idylle des localisations, si souvent caillé, n'est plus que mal par des hypothèses de secours n'ont + que ruines : "chez l'animal inbél, il n'y a rien de refl. isolé."

1/ On sectionne 2 nerfs périphériques ; on laisse se développer les fibres régénératrices et de 2 tronçons ~~et~~ tenant, de la voie périphérique de l'autre -

on peut ainsi provoquer l'innervation et l'effectuer provenant des cellules motrices (de et sont disant "centre flexeur").

2/ On substitue l'un à l'autre les 2 nerfs sciatiques. Il apparaît du mot normal, ce qui après l'opération, leur exercice exerce une collaboration à la normale du muscle.

De il n'y a pas de spécificité fonctionnelle invariable du centre.

3/ on échange les muscles antagonistes des yeux. Or on les continuent à se mouvoir normalement ensemble.

On en est capable de montrer le centre de coordination. (après Bayliss et H. 1903).

BnF
MSS

