

## Instinct et évolution

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Coteb044\_A\_f0684

SourceBoite\_044\_A-35-chem | La psychologie animale.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).  
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

---

Demoff (Instinkt u. Entwicklung. München. 1933)

1/ Si on débute 1 parti de l'embryon d'oursin, la parti séparée recommence son évolution dès le début et donne naissance à un animal normal.

2/ De même les insectes : 1 chenille achève presque son cocon. on la place et 1 cocon ~~est~~ fait et 'blanchi' : elle achève celui-ci produisant 1 forme normale.

3/ Mais si on place 1 chenille qui a traversé ~~presque~~  $\frac{1}{3}$  de son cocon, et 1 cocon presque achevé. Elle en produit 1 très grand. Elle continue à travailler sur son cocon presque achevé et s'arrête à moitié qu'elle a traversé.

"De l'instinct et de l'évolution, on ne peut parler des êtres qui n'ont pu encore être traversés, alors qu'ils sont prêts de rétrograder vers des phases d'après" (Demoff)

Dr. Buytenhek.

(München. 1923)



