[titre non renseigné] 0001_b8_8_00001-20240613_165459

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

LangueFrançais
TypeFicheLecture

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
DroitsNotice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).
Notice créée par Richard Walter Notice créée le 26/06/2025 Dernière modification le 08/07/2025

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/20860?context=pdf

K. D. Keele,
Clinical Medicine in the 1860s
in Medicine and Science in the 1860
(F. Poynter ed).

clinique et travaux scientifique.

– Guttmann (Handbook of Physical Diagnosis 1872), très largement répandu en Europe, fait le bilan des nouvelles mét. introduites en médecine depuis le temps de Laennec. Thermomètre. Pression artérielle. Spirometre.

– Le thermomètre médical apparaît 1850 w Ludwig Traube (1850), il emploie sur 25000 malades pris w Carl Wunderlich (1868)

– L'analyse chimique de l'urine existe pris w Berzelius. Prouter 1821 protagonistes gravimétrie. vers les années 1855-65, méth volumétriques. Cf 1860 Neubauer et Vogel, Analyse qual. et quant de l'urine

– Après que on a connu les chemins optiques et chromatismes du microscope, on a pu étudier analyse des cellules sanguines. Donné, à Paris, découvre les leucocytes. Beale publie 1854 The microscope in medicine

– L'endoscopie vers les années 60 Mais pr éclairages archaïques toutes utilisées. L'ophtalmoscope

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/20860?context=pdf

de Helmholtz date de 1851. mais on utilisait
ophtalmoscope bien + tôt

— Lance Henle toxine est découverte par Wells,
morbus, et Simpson en 1844-47. Mythologie
des origines. mais en réalité vaccin, ~~et~~
~~avec~~ ce sur population des hôpitaux → morbilli

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/20860?context=pdf