

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionFiches dispersées](#)[CollectionBoite_008 - Histoire de la médecine](#)[CollectionBoite_008-8-chem](#)[Item\[titre non renseigné\]](#)
[0003_b8_8_00003-20240613_165459](#)

[titre non renseigné]

0003_b8_8_00003-20240613_165459

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

DroitsNotice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [Richard Walter](#) Notice créée le 26/06/2025 Dernière modification le 08/07/2025

J. B. Aymer
Dictionnaire pour l'enfant
n° 13-22

Mécanisme de la cécité.

a/ Le temps de la macule (Galen De crasi I, 8)

- le $\frac{1}{2}$ du sang noir de coction, le lymphatique
résultant ne guérit point de la cécité.
- l'augmentation excessive de lymphatique
- l'excès (indisposition à $a + h$ et h)
- la douleur (doloratio)

La cécité suit au 3^{ème} moment. Galien ~~dit~~
dit que la macule n'est d'un côté que si
y a une issue si parfaite coction.

af La coction, c'est le mécanisme par lequel le mucus
(mucus) et le brouillard "ont été" absorbés, qu'elle
approuvent de la cécité que nos lignes ont naturellement
elles peuvent + les

- ou bien, elles sont elles-mêmes pour et
la visqueuse exerce (une, deux, etc.)
- ou bien former un dépôt (+ les)

c. chaque sorte d'obstruction critique a sa propre
issue :

- souvent sont annoncées par la suppression de
unus, le plus souvent, le rougissement du visage,
rouge plein et mol. (Galen De crasi I, 8)

- saignée de nez : rouge tout, rougissement de
la tête, bêtise de l'entendement, chagrin.

- le vomissement peut aussi se présenter, avec
nausées, des vomissements, parfois de mucus

Les urines sont, d'après les auteurs, leur
vie de ~~la~~ ~~pour~~ au moins : d'1 heure à 2 h,
1 à 2 h. on s'en le 7 par 1 saignée de sang ; 1 à 2 f.
à un jour avec mucus, 1 h. d'urine à 2 h, 4
1/2 par de sueurs (17)

D'après les auteurs, au bout d'un jour + 1/2 que durer
et ils ont vu des de jours que durer (18)
indicateurs (18). D'après les auteurs, sont
des urines que la urine est annoncée à un jour
avant qu'elle " soit "

Les jours indicateurs sont indiqués par l'analyse
de la urine, sont à 4 jours de
l'urine de urine.

Ces jours sont les jours indiqués en

- les jours : 7, 14, 20, puis 27, 34, 40
- les jours : 4, 11, 17.

Quel que soit le jour, de 20, 40, 60, 80, 100. (de l'urine
de l'urine. LIII chap 8)