

[Storch, Die Psychoanalyse und die menschlichen Existenzprobleme - suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb042_B_f0099

SourceBoite_042_B-2-chem | Binswanger et autour.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées

- [Freud, Sigmund](#)
- [Gebssattel, Viktor Emil von](#)
- [Straus, Erwin Walter Maximilian](#)

Références bibliographiques

- [Gebssattel, Zur Psychopathologie der Phobien. I. Teil. Die psychasthenische Phobie. Nervenarzt 8, 7, 1935, p. 337-346. 8, 8, p. 398-408](#)
- [Straus, Geschehnis und Erlebnis, zugleich eine historiologische Deutung des psychischen Traumas und Renten-Neurose, Berlin, Springer, 1930](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/03/2020 Dernière modification le 23/04/2021

sau qui il y ait possibilité de tourner vers l'avenir n'est. Ce qui guérit est la hésitation, cette peur d'une prochaine répétition, mais ce qui est nouveau - La xth, et là ⁹⁹ | transformation doit partir d'une "schicksalsverbründenheit", et non d'une telle image qui se met à la figure de l'aide médicale : cette peur à la figure de l'aide médicale. cette peur à la figure de l'aide médicale. cette peur à la figure de l'aide médicale.

Et Freud, la répétition a-t-elle un rôle caractéristique du malade. Il a en raison de définir en termes névrotiques de "Wiederklang" pour la puissance de l'acte "Wiederholungszwang" ; mais cette répétition n'est que la manifestation de l'impossibilité pour l'homme de développer vers de nouvelles possibilités, et sur ce qu'il est arrivé dans des situations gestaltées.

BnF
MSS

Il ne s'agit pas de décrire les symptômes, de l'histoirer au malade, que de décrire la structure particulière de la "Wiederholung" qui trouve son expression dans les symptômes du type de niveau en question.

Ex de Phobie :

- Freud : la "symptomhilfung" est secondaire par rapport à l'Angstentwicklung ; l'inhibition phagocytique qui est une Angstentwicklung

Parce que, d'air des mécanismes de protection,
qui, si l'on ne fonctionnent pas, peuvent apparaître
l'angoisse. Cette angoisse est l'angoisse
devant la phobie (qui prend un nom à
Raumangst : sujet subit inse et insec).
Les théories sont : la transformation de
l'angoisse névrotique en angoisse en
apparence nuelle.

- S. Freud (Ceschelnis v. Erlebnis. 1930-1938)

"les phobies démontrent l'incompréhension aussi
évidente qu'un chercheur l'application rationaliste.
Chez l'individu dominé par l'Raumangst (étant
ne peut se tenir debout sur le balcon, c'est le
contenu symbolique de la peur fondante qui provoque
le vertige. Le phobique cherche, par tous moyens,
à échapper à l'Erlebnis de menace, il peut cependant
toujours les limites qui le frangent et l'angoisse
... Alors que celui qui est subordonné à
l' Selbstverwirrung, se débarrasse également
à déjà fait ce sentiment négatif, c'est le von Erlebnis
qui renvoie toujours aux phobies. De sorte avec
le monde n'est pas mené à point. La névrose
est à ce stade bâtie."

- C. G. Jung / Die psychologische Phobie
Nervenarzt L. Scanno. 1935)