

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_042_B | Littérature, sodomie, hérésie, homosexualité. \[B\]](#)[CollectionBoite_042_B-3-chem | Physiologie des sensations.](#)
[Item](#)[Audition et espace](#)

Audition et espace

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb042_B_f0327

SourceBoite_042_B-3-chem | Physiologie des sensations.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées

- [Perrot](#)
- [Peterson](#)
- [Rayleigh, John William Strutt](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).


Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/03/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Repérage latéral : soit 1 système à microphones unique qui avec 1 élé peut être branché sur ~~les~~ syst. à microphones double : qd on [107] du ventur a 7 mgl et qu'on passe du simple au double, il y a immersion de spatialisation.

si on a 1 en pur, échantillon, et que la source est diéremique, il y a décalage : on peut avoir 1 décalage avec opposition complète.



En 1918 Perrot avec 1 potentiomètre à charge

le rapport de intensités : 102 se différencie / seul, où la diff^e d'intensité fait paraître depla^{ce}ment de la source sonore. Lorsque l'intensité augmente, le seuil baisse (pour les int. faibles : 30% de diff^e sont nécessaires ; pour les int. fortes : 5%.)


Il y a 1 variation logarithmique : lorsque le rapport de 1 à 2 se place^{nt} de 15°, pour 1 rapport de 1 à 6, se place^{nt} apparent de 35°.

cette diff^e d'intensité varie selon la fréquence

BnF
MSS

Taché de l'ombre de la tige et + sensible
les uns & les autres -

Erreur moyenne (Stevens & Newman) est
de 11° ⁽⁵⁰⁾ pour des fréquences basses; de 20° ^{de 3000} pour les fréquences
plus élevées à n = 10.000



De la + gde précision n'est pas pour les régions moyennes : c'est que la diff^e d'intensité est + sensible pour les fréquences basses, pour les hautes fréquences, c'est la diff^e de phase. En 1907 Lord Rayleigh en a fait la démonstration (avec l'aide d'un quelconque changeant la phase. Prévision de 200 pour les Petros obtenus des variations continues

Peterson a étudié les variations angulaires (changement de la diff^e de phase : $\pi/20$ de variation de phase. L'angle de déviation apparente, à l'équateur 45°, mais elle se réduisant à 5° pour 1000 pour les seules machines en écart de temps sont + cohérentes. Le début de la phase périodique est décalé de temps. 70 millionsième de s. pour 200 périodes.