

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_042_B | Littérature, sodomie, hérésie, homosexualité. \[B\]](#)[CollectionBoite_042_B-3-chem | Physiologie des sensations. Item](#)[\[M.L. Verrier. Biologie de la vision - fin\]](#)

[M.L. Verrier. Biologie de la vision - fin]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**b042_B_f0362**

Source**Boite_042_B-3-chem | Physiologie des sensations.**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Personnes citées**[Fessard, Alfred](#)**

Références bibliographiques**[Piéron, La sensation guide de vie](#)**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/03/2020 Dernière modification le 23/04/2021

ciens de grande motricité (raies, horpilles) -
 ne m'ont pas d'animant diurnes ont en majorité des
 brachéopodes (Ruminant)



362

de dualité chez les Arthropodes.

Exposer du moins 2 gros groupes de yeux d'Arthropodes

1. Les yeux où la cornée b'écrit la rétine et au
 contact du cône cristallin : image par appariement.

2. Les yeux où la cornée est séparée du cône cristallin
 ⇒ image par superposition



En joignant ces
 formes extrêmes et série
 englobant les intermédiaires

Type: si par qques cas particuliers l'achète
 diurne et nocturne est indépendante de la forme et de
 la structure des yeux.

BnF
MSS

vision et de l'optique psychique . de l'optique

obtenue 1. de l'optique et la psychique et
 l'extension de la vision ; + l'œil sensitif et l'encéphale
 sensitif de l'optique.

Mail de l'optique englobant le tout de l'optique avec

en centre optique occipital. Il n'a de + seulement
que sur 2 espèces.

Sensation guidée de vie (r 346)

Electroretinogramme obtenu chez eh. après retard
qui ne produisant pas d'intensité au moins
30 à 40 millisecons, le retard augmente tout le long
de l'intensité diminue de proche en proche.

Par réaction d'arrêt du centre cérébral α , se
modifie avec 1 certain retard jamais inférieur à
160 millisecons. avant atteindre 360 (Dunlop &
Fellner),