Les deux traumatismes.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0085
SourceBoite_039-3-chem | Freud.
LangueFrançais
TypeFicheLecture
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Les deux traumatismes.

"J'ai pu parfois établir que le symptome en question avait fait une courte apparition dès le premier traumatisme pour disparaître ensuite jusqu'à ce qu'un autre choc le fît surgir de l'obscurité."

"La suppression du symptome ne devient possible qu'en tenant compte de toutes les motivations ... Il y a convergence de l'effet de ces avec hier que de demain."

BnF MSS

p 138

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/434?context=pdf

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/434?context=pdf