Genèse de l'hystérie.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0100
SourceBoite_039-3-chem | Freud.
LangueFrançais
TypeFicheLecture
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

"Ne considérons les symptômes hystériques et des affects et des réminiscences qui ont été la manière de traumatisme sur le s.n. le résidu ne permettant pas que l'émoi initial soit éliminé par réaction ou élaboration mentale. Il est devenu impossible de ne pas prendre en considération la question de ce que (si elle n'est pas mesurable). Il faut comprendre que il se peut qu'si une certaine somme d'excitation abordant le s.n. se trouvait transformée en symptôme de la manière où elle n'est pas utilisée si forme d'action extérieure

BnF MSS 167

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/449?context=pdf