

Genèse de l'hystérie.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0100

SourceBoite_039-3-chem | Freud.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

"Ne considérons les symptômes hybrides
q'des affect et des régressions d'émotions
qui ont « si » la manière de brama-
liser sur le s.n. le résidu ne permet
ni q'd'elles ~~se~~ s'envoient initialement
ni par « brachon ou élaboration mentale.
Il est devenu impossible de ne pas prendre
en considération la question de la gu. (un ii
elle n'est pas mesurable). Il faut comprendre
que H n'est pas si une certaine somme
d'excitation surtout le s.n. se trouve
transformé en symptômes de la mesure où
elle n'est pas utilisée si bonne réaction est-elle



167

