

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_039 | Freud. Sexualité. Folie. \(Cours de Vincennes\).CollectionBoite_039-4-chem | Les hormones et le comportement sexuel.](#)
[ItemSoulairac \[?\]. | Les hormones. \[suite\]](#)

Soulairac [?]. | Les hormones. [suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0109

SourceBoite_039-4-chem | Les hormones et le comportement sexuel.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

- Les mammifères. L'achute du mâle est pratiquée couramment.³

① Chez les mammifères inférieurs (rat, cobaye) au moment de l'oestrus la femelle accepte le mâle de se faire avec lui. Au moment de l'oestrus, attitude caractéristique (col. vertébrale). 108

Warner met les mâles et côtes; la femelle et l'autre côté: entre les 2 il trouve avec grille électrique: un oestrus la femelle ne peut qu'il essaye de passer de l'autre côté; un oestrus, + seules usées.

Parfois la corrélation est - évidente chez les animaux inférieurs les femelles ne sont pas aptes à accepter la copulation.

- Chez le cobaye parallèle avec le comportement sexuel et le cycle oestrien: diminution de la colonne vertébrale, petits cris gutturaux, et attitudes d'accouplement des femelles, s'il n'y a pas de mâle, au moment du rut. Il dure 48 heures, après quoi la femelle refuse le mâle, et perd le morote. Expérimentateur pour provoquer des réactions que le mâle. (Papanicolaou fait des vérifications régulières pour prouver cette corrélation).

- Chez la souris, c'est le rapport avec le mâle qui provoque la ovulation (de même pour le chat, le furet). Au moment de l'oestrus, les moindres contacts avec le mâle provoquent les réactions hystériques du côté. Le rut de l'animal ne dépend pas de l'ovulation, mais de la présence de l'ovule et l'ovaire en période jusqu'à partir d'un certain niveau.

② Chez les animaux sauvages on trouve parallèle: ainsi la marche (marche américaine): l'ovulation provoque les modifications des organes sexuels et (gonophrim de la vulve). Aussi chez le renard

En 1944 Pearson a étudié le comportement sexuel chez le

BnF
MSS

mutualisme où il y a chez le mâle achète sexuelle
nière - il y a chez le mâle accouplé testiculaire: fré-
quentes érections m chez l'animal endormi, recouvert
de mites (mâle se réveille au moment de l'accouplé^m)
Mais chez le lion, dè le comport^m est assez semblable
à celui du chat (femelle $\rightarrow$ ovulation provoquée). En
période de rut la femelle se met à sauter / sauter.

② Des animaux domestiques: la période de chaleur
correspond exact^m à la phase de maturation folliculaire.

Des primates.

leur comport^m sexuel du singe a été étudié
considéré c/ non soumis au cycle oestrien: on croyait que la
femelle acceptait le mâle n'importe quel moment. Par
on a observé des périodes cycliques non seulement chez les
singes, mais chez les anthropoïdes.

Gar, en 1928, observe que la femelle Chacma n'accepte
le mâle que la période d'œstrus, mais qu'elle le tolère
en œstrus. Zuckerman montre que la région périnéale
(peau recouverte) se gonfle au moment de l'œstrus
(gonflement). Par conséquent, il y a accouplé^m possible

Des Macaques (*Macacus maurus*) présentent 1 cycle-
accouplé: pendant le désir de copuler est au maximum
la peau périnéale est gonflée au maximum; si on Ball
sans jamais arriver à l'acte complet d'accouplé^m, le
cycle s'inverse

