

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_039 | Freud. Sexualité. Folie. \(Cours de Vincennes\).CollectionBoite_039-4-chem | Les hormones et le comportement sexuel.](#)[ItemSoulairac \[?\]. | Les hormones. \[suite\]](#)

Soulairac [?]. | Les hormones. [suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0110

SourceBoite_039-4-chem | Les hormones et le comportement sexuel.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

4
Le lepus ne s'accouple qu'en période d'œstrus. Mais
ce sont surtout Köhler et Yerkes à Yale qui ont étudié
le changement : bien que la copulation puisse se faire à n'importe
quel moment, elle est surtout fréquente au moment de
gonflement de la peau périnéale. 109

① d'erreur primitive sur ce sujet vient de l'ignorance
des facteurs non sexuels : concheries des animaux, rapports
sociaux. Yerkes et Stellder (1936) ont ~~pris~~ pris un
groupe homogène de sujets et ont vu que la copulation se
fait de ce haut moyen du cycle œstrien. En faisant
varier la relation entre les singes, on obtient des résultats
différents : si les individus sont hostiles, la fréquence de
la copulation se situe au 1^{er} tiers ou au 1^{er} et dernier
tiers. Le cycle est de quelques jours d'agressivité du
mâle, ou la timidité de la femelle.

Certains équivalents peuvent être observés chez le rat, où
le mâle est agressif et la femelle réceptive.

② Les femelles acceptent de s'accoupler avec le mâle pour
obtenir du lait + du nourriture, ou aide chez des ennemis.
Qu'on observe les singes, ils augmentent la copulation.

Carpenter a étudié des Macaque en Libérie (Macaca
Mulatta) : l'œstrus est long + net qu'en la constat, il
dure 9 jours ; intéressant des rapports sociologiques
(ordre des femelles, dominance des mâles, division des animaux)
Ces facteurs non sexuels augmentent ou diminuent la
période de réception, mais ne la suppriment pas. (BnF MSS)

B - 2' Experimentation

I on peut provoquer des cycles des trices, qui entraînent des comportements explosifs.

2 techniques : administration directe des hormones
 { voie trans indirectes par injection des hormo
nostimulants

On a pu obtenir des résultats chez le ver à soie:

↳ chez le poisson rouge, 9 mois avant le période de ponte, on voit apparaître le/les, après injection d'hormones de carpe.

2. chez la grenouille → amples par administration
de test hypophysaire, provenant d'grenouille ou d'
d' mammifère. qd on injecte assez d'hypophyse, tout
le comport^{mt} on rut apparait

de crocod / Xenopus sub africain) : qd. Best en carthiste
et période de venue de crocod : aucun cycle reuel ; on en
vo vague (avec population de oviposition) en infection
des infections hypopharyngées ou de gonado tropand, chez
la femelle on infecte des progénitures

Shapiro ~~ou~~ tendo d'outro canceros que les regions
anti-hypothyroides étaient intéressées au sport-vein.

Die Hypothese ergibt sich als intermediäre des gonados. in der

- les hormones se mettent en mouvement le résultat

- chez animaux castrés, les injections d'hypophyse ne provoquent rien, alors que chez même seriente reconstituée.

chez les Ruminants le testostérone fait apparaître Complexes