

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite\\_039 | Freud. Sexualité. Folie. \(Cours de Vincennes\).CollectionBoite\\_039-4-chem | Les hormones et le comportement sexuel.](#)[ItemSoulairac \[?\]. | Les hormones. \[suite\]](#)

## Soulairac [?]. | Les hormones. [suite]

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Coteb039\_f0115

SourceBoite\_039-4-chem | Les hormones et le comportement sexuel.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).  
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

---

1 dose inf. de Testostérone peut rendre 1 C.S. à 1 ani-  
mal qui n'a été privé par 1 tést. virile; le testo.  
a influencé sur les animaux de la gonade avec  
atrophies par manichon

114

(C) La femelle.

Mâle chez : adu hormone  $\varnothing \rightarrow$  C.S.

1 En 300 technique: greffe ovarienne et injection  
hormonale  $\rightarrow$  reproductibilité et résultats en animaux.

2 En la femelle: résultats contradictoires; la progestérone  
inhibe ou exalte

- inhibe la caprice et le plaisir de l'ovulation  
C'est-à-dire: l'ov. + refus du mâle et m d'ovulation

- excite rats, souris, cobayes. 1 petite dose  
d'œstrogène, puis 8 h après progestérone  $\rightarrow$  se reproduit

Avec des hormones voisines (Testostérone) m de résultat.

La simple folliculécine a des effets + corps et + l'ov.

Folliculécine + progest.  $\rightarrow$  C.S. chez la souris ou hypophysectomisée

3 Bernal & Ball (1936) sur la  $\varnothing$  Mâles en castré  
Folliculécine  $\rightarrow$  les réponses des animaux reviennent  
à celles des animaux mâles.

BnF  
MSS

IV Effet du gl. endo. non serviles.

1 de l'hypophyse: lié à la croissance. Peasge (1941) a dit  
à des rats de 15 j. sans effet sur la reproductibilité



si on administre des extraits de th. à des rats castrés, la réceptivité est diminuée.

## 2 de Thyroïde.

a chez le oiseau: on admin.  $\rightarrow$  diminution du C.S.  
(inhibition de l'activité ovarienne. Collins. 1946)

• son extract provoque / regression du C.S., et l'induction du 1<sup>er</sup> sex (crête, bécotage). Le C.S. redevient normal, si on en administre

## b Chez les Mammifères

• le taureau: après 4 mois: les gonades se développent, mais le C.S. se comporte est normal: par administration artificielle  $\rightarrow$  produits normaux.

Avm. à de tels animaux  $\rightarrow$  C.S.

• rat: ① chez le mâle; ~~après~~ C.S.  $\downarrow$

② chez la femelle C.S.  $\rightarrow$   
administration aux animaux mâles C.S.  $\rightarrow$

## 3 Les surrénals

Certaines stéroïdes corticosurrénales ont l'action androgène; l'adm. de desoxycorticostérone ~~est~~ ~~très~~ ~~trav~~ ~~ment~~ le C.S.

## 4 Substances pharmacol. non endocriniennes,

- la yohimbine chez le rat C.S.  $\rightarrow$ ; chez les canards m d'effet. Elle inhibe les gonadotrophes hypophysaires

- et morphine (Spragg 1940) chez le singe, l'excitation augmente (effet contraire chez l'h).