

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_039 | Freud. Sexualité. Folie. \(Cours de Vincennes\).CollectionBoite_039-4-chem | Les hormones et le comportement sexuel.](#)[ItemSoulairac \[?\]. | Les hormones. \[suite\]](#)

Soulairac [?]. | Les hormones. [suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0118

SourceBoite_039-4-chem | Les hormones et le comportement sexuel.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

5 Caractéristiques sexuelles chez des animaux non traités 117
En cas de gonades normales, il y a un 3^e prépondérance
et C.S. chez certains au. Les préclades existent en 1
suite d'actes identiques chez les 2 sexes : par les o/m du C.S.

a chez les poissons : C.S. identiques jusqu'à l'oviposition :
seule la quantité d'émission de sperm ou d'ovules permet
de distinguer le sexe.

b Oiseaux : préclades : involution mutuelle et réciproque
des penches sur tout si le mâle est castré ou opère du
cerveau - chez le Pigeon le rôle du sexe est nettement
changeable jusqu'à la saison d'ick sexade / mutuelle.

c Mammifères : la lunette de test, les testicules ont
des critères de C.S. ♂ au moment de l'ovulation. Balle
pense que c'est dû à la présence d'androgènes et la ~~folliculose~~
soulève le technique de l'ovaire. Mais Beach a montré
que la castration ne changeait rien à la ltr.

Picé : cortex des surrénales.

(B) et Male

BnF
MSS

et C.S. ♀ chez le mâle est + rare que le C.S. ♂ chez la ♀
Pour tant, assez fréquent chez les rats ♂ nuancés
si on castré des mâles qui ont l'acipnd des testicules
laminés, le C.S. ♀ disparaît 11 de suite, le C.S. ♂
disparaît progressivement. Si on leur injecte des androgènes,
les C.S. ♀ et ♂ reparaissent à 2.

2 anomalies nait de pu endocrinienne.

on peut admettre : ① l'équilibre entre eux

② l'inhibition qui peut être levée par la stimulation externe.

II Mécanismes de l'action hormonale

① Syst. neuro végétatif et org. sexuels

1. Syst. neuro végétatif

l'influx nerveux qui provoque le C.S. normal pu des org. sexuels externes.

② on entend a l'excès de cobayes castrés, utérus, ~~ovaires~~, on injecte F.S.H + L.H $\rightarrow$ C.S. normal

③ la suppression du symp. ^(Baer) abdominal n'a pu donner d'influence ; de la suppression du plexus mésentérique sup.

Bard en 1935, à l'égard de chats, entend : l'utérus, le symp. abd., la moelle sacrale, ou l'excès : le C.S. reste normal si on injecte F.S.H + L.H.

de la chez le mâle : la suppression du symp. abd. empêche l'écoulement, mais pas le C.S. (Baer) (même la suppression de la prostate).

2. Organe des sens : Brooks entend a l'excès l'expression, le goût olfactif, le nerf auditif le C.S. reste normal

Concl : il n'y a intervention - ni du symp
- ni de la sensibilité générale
- ni des app. sensoriels