

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_039 | Freud. Sexualité. Folie. \(Cours de Vincennes\).CollectionBoite_039-4-chem | Les hormones et le comportement sexuel.](#)[ItemSoulairac \[?\]. | Les hormones. \[suite\]](#)

Soulairac [?]. | Les hormones. [suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0119

SourceBoite_039-4-chem | Les hormones et le comportement sexuel.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

(B) Rôle du cortex

118

- Effet gen^x : Bechterew (1910) pensait que le contrôle C.S. était correct - Rogers enlevé à des rats, prouve le cortex : CS $\rightarrow$ Rashley pense que lorsque on abaisse du cortex le CS $\rightarrow$ ~~est~~ est pr que le sujet est aveugle mais est pr que l'intégration de l'information du stimulus ne se fait pas

Y de exp^u de Beach (1919) montrant $\frac{1}{2}$

- qu'1 lesur de 60% du cortex $\rightarrow$ le C.S.

- moins de 60% le C.S. $\rightarrow$ (niveau de complexité)

2 Effet sur la manière de se faire copier

- Il y a guère d'anomalie que lorsque le stimulus unitaire - la lésion est souvent + efficace que le stimulus étalé - actif

3 Localisation et étendue - A sur/au globe et lésion étendue est + grave

(C) Effet de castration

1) au différents cas

BnF
MSS

- a. hémidecortiqués : CS revient à son effet 7 mg; ~~par~~ les cas non hémidecortiqués, 10 à 15 mg

- a. hémidecortiqués + castrés : 10 ou 15 mg / ou 7 mg

- a. decortiqués : 15 à 20 mg

2 Effet des anastomoses

Apparait, il y a et le C.S. est ou tout ou rien.
Pour tout, certains animaux n'ont pas de C.S. et ont
d'autres au contraire. La production du C. copulatoire
dépend de l'obtention et semblerait, au dessous duquel,
il n'y a que l'excitation subliminale. Semblait être
élévé ou bas selon les ~~anastomoses~~ individus.

La perte d'un des cortex entraînant l'absence
générale de l'activité : si le reste copulatoire est élevé
le C.S. ∇ ; sinon le C.S. $\Rightarrow$

3 Interprétation des résultats.

C'est la ^{dissection du} cortex agissant sur le C.S.

1 Troubles de motilité ? Il ne faut pas ; des
animaux qui ont de grands troubles peuvent copuler

2 Troubles de sensibilité ? des animaux
qui ont perdu 3 sens.

3 Suppression de l'axe nerveux organique
le schéma de coup ? l'animal n'est pas corrigé
recupère après l'extinction.

4 Il est en fait la perte du tissu nerveux qui
contribue à l'intégration de tous les stimuli sensoriels
et utiliser les stimulus adéquats de l'excitation
nerveuse.