

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_039 | Freud. Sexualité. Folie. \(Cours de Vincennes\).CollectionBoite_039-4-chem | Les hormones et le comportement sexuel.](#)[ItemSoulairac \[?\]. | Les hormones. \[suite\]](#)

Soulairac [?]. | Les hormones. [suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0120

SourceBoite_039-4-chem | Les hormones et le comportement sexuel.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Peu corréaux et hormones testiculaires ont
l'effet semblable, complémentaire sur le C.S. ^{externe} ~~interne~~
Effet immatif : 1 hôte et 1 androgène peut compenser
l'activité corticale réduite et vice versa. 119

Chap IV Facteurs externes de neurologiques sur le C.S.

I. Les facteurs externes.

A Poissons : la présence d'autre animaux induit le C.S.
mâle et 1 femelle et 2 aquariums diff. : la circulation s'accroît

B Amphibiens : l'ovoposition du mâle change le comportement
le mâle qui après avoir été par le mâle : un effet si on le place
sur le sexe avec 1 esquisse de caoukhone.

C Oiseaux : croissance ovarienne liée à la lumière
à la présence du mâle, à la stimulation du mâle.

① Roberti sur le Pinguin : stimuli → production
hormones / ovaires.

② Matthews (1939) : pigeon isolé ne pondait
pas ; si elle est repérée par 1 mâle d'1 pigeon, elle
pond (mais non) BnF
MSS

③ Witt : la glande du pigeon n'apparaît qu'à
la vue du mâle

D - Mammifères

1 à ovulation provoquée.

- l'ouïe (Enders 1945) : ovulation ne se fait jamais chez la femelle isolée (deux ovaires sont d'ailleurs atrophiques) l'intromission n'est pas nécessaire : seul l'électro-stimule.

- Rapine : l'ovulation peut intervenir si la femelle est mentée par la femelle. l'intromission n'est pas nécessaire. Si n'y a qu'intromission, et si les stimuli sont supprimés on a l'ovulation.

Modification du cell. anté-hypophysaire.

2 à ovulation ~~provoquée~~ spontanée.

① chez le Rat le corps jaune se développe / on observe l'œuf actif que si on a eu soit une excitation mécanique du vagin. Soit stimuli nerveux libérant l'HT (liverell).

② chez le gros chat le cycle est fertile raccourci le cycle est bref.

Facteurs ♀

- des ovariens non mâles peuvent copuler aussi souvent que des ovariens mâles à l'androgyne, par conséquent
- chez des jeunes chiens au mâle, après un acte nuptial réapparaît la nichée de type femelle.

II) Rôle du système nerveux

i) Animaux spandus = on ou peu de C.S. simple sur excitation mécanique.