

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_039 | Freud. Sexualité. Folie. \(Cours de Vincennes\).CollectionBoite_039-4-chem | Les hormones et le comportement sexuel.](#)
[ItemSoulairac \[?\]. | Les hormones. \[suite\]](#)

Soulairac [?]. | Les hormones. [suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0121

SourceBoite_039-4-chem | Les hormones et le comportement sexuel.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

2) Animaux dérétrés = réaction motrice non
spécifique du C.S. (excitation méca)

3) Autre témoin : Baril sur 25 charnières rigides
dérétrés = excitation méca du noyau d'innervation
rigidité en extension de la tête dorsale.

III) L'hypothalamus.

En contact avec le cerveau du mésencéphale sup.
au niveau du noyau ss. cérébral
Mésencéphale sup. ou diencephale.

De l'hypothalamus | pericardique pour chimie de la tête
+ infund. ou suite
postre / jusqu'aux épaules

Après l'essai au dessus du chirore C.S. →

_____ sous des C.M. C.S. ⇒

Baril pour qu'on ait surff l'hypoth. post?

BNF
MSS

Etude de l'Hypoth.

A Les différents centres nerveux

1. mesencéphale sup^r : qd il y a une lésion que l'on peut être réhabilité m de C.S ; qques reac posturales qui on ne peut assimiler au C.S et qui ne sont pas modifiées par les hormones.

2. Niveau sup^r du cerveau (cortex) : la suppression du cortex ne supprime pas le C.S.

3. Formations sub-corticales (striatum, é. optique, th) : leur destruction n'empêche pas le C.S.

Il faut chercher ds l'hypothalamus.

B L'hypothalamus

{	partie ant ^é (chiasma i. h. pituitaire)
	— infundibulaire
	— postérieure (de l'infundibule aux c. mammillaires)

Exp^{ts} : 1. lésion au niveau du chiasma permet le C.S.

2. lésion au c. mammillaires ne le permet pas

Bard croit que c'est l'élément l'hypothalamus postérieur : en fait lésion globale de l'hypoth. provoque l'arrêt complet du cycle oestrien.

cf. travaux de Bard, Dempsey et Rioch (1939-41).

C Exp^{ts} sur le cobaye
Brookhardt, Day et Ranson