

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_039 | Freud. Sexualité. Folie. \(Cours de Vincennes\).CollectionBoite_039-4-chem | Les hormones et le comportement sexuel.](#)[ItemSoulairac \[?\]. | Les hormones. \[suite\]](#)

Soulairac [?]. | Les hormones. [suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0122

SourceBoite_039-4-chem | Les hormones et le comportement sexuel.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

ReO : app. de Horsley - Clarke pour électrocoagulation
Chaque animal subit 3 lésions : 1 sur la ligne médiane
1 de chaque côté à 1 mm de la ligne médiane.
Les lésions sont faites en arrière du bord antérieur du
chiasme, et prof. de 1 mm au-dessus de la surface
ventrale du cerveau (hypoth. ant.). 121

Animal de contrôle ayant subi deux lésions
mais à 6 mm (subth.)

Résultats (sur 50 animaux)

1 Perle complète du C.S.

2 Mod. fonction variables au niveau du tractus

1^{er} gr: changements cycliques normaux (modification
du sang, de la vulve, du comportement)

2^e gr: hypertrophie du org. génital et
ouverture permanente du vagin

3^e gr: atrophie du org. génital et fermeture
permanente du vagin

BnF
MSS

3 Action du h. ovarien sur les 3 groupes.

② Au gr. 1 : foll. et prog. action nulle. Rien
si la dose augmente. Rien d'anormal au niveau
hormonal. De trouble du système nerveux central.

③ Au gr. 2 : foll. et prog. → réduction de l'hypertro-
phie ; rétablissement du cycle d'ouverture et de fermeture
du vagin ; mais pas de C.S.

⑦ Gr. 3 : Foll + prog. revient normaux en org. génitales, mais pas de P.S.

de l'action des hormones hypophysaires
 La lésion hypoth. provoque r-t. lésion de l'hypophyse.
 Aussi a-t-on provoqué les lésions par ventricule, à 7 moments où l'h. hypophysaire est sécrétée.

On a eu 17 animaux. On a fait 17 injections de l'œstro-
 gène. On lève l'hypoth. à 6 ventricules, à 6 autres
 lésions. On administre de Cr prog. 9 à 12h
 après la lésion. Seul le groupe lésion 2 / C.S.

N°	Durée entre opération et progestérone	Durée jusqu'à l'œstrus	Intervalle	cessis temps de la lune	Debut de l'œstrus, 11-14 < résultat
groupe lésion 1					
4	12	14 à 17h	3 à 5h	3 à 5h	3 à 6h
6	12	14 à 17h	8 à 10h	3 à 5h	3 à 6h
groupe lésion 2					
	12h	0	8 à 10h	0	0

on a compliqué l'exp. en injectant LH, F.S.H.,
 folliculins, progestins. Pas de résultat de l'exp.
 lésion 2.

Ceci montre

① les hormones agissent sur l'hypoth. et sur le
 système S.N. périphérique.