

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_039 | Freud. Sexualité. Folie. \(Cours de Vincennes\).CollectionBoite_039-5-chem | Connaissance de l'espèce. Item](#)[\[La connaissance de l'espèce. suite\]](#)

[La connaissance de l'espèce. suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0131

SourceBoite_039-5-chem | Connaissance de l'espèce.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

un autre plus, d'plus l'air, il y a des organes spécifiques (chez
les insectes il y a le balancement de cloche; si on frappe l'un
d'eux de son battant de cloche, elle vibre en un lieu). 130
En fait, on a 1 g de sensibilité: si on place des pinces dans
l'air, on s'aperçoit que la pince est + dense que l'air; elle
tombe au fond. Elle ne monte sur l'air, suivant la légèreté
de l'air. Si on fait varier l'inclinaison de cette pince,
on trouve sous cette inclinaison un si elle ne dépasse 20 minutes
l'angle (un seul chez l'h.). - 1 chat peut se porter en l'air,
tomber sur les pattes.

En fait le repérage visuel et le repérage spécifique. On
a parfois des discordances: la verticale apparente peut être
mêlée, on trouve l'air en fait sur les chemins de bois). Le
que nous ne pouvons pas spécifier, c'est la force de la pesanteur
sur la surface de la terre, la variation entre l'équateur
et l'équateur 1/1000; si on s'élève en l'air, l'influence de l'air
traverse diff. de 1/10.000^e). Mêmes renseignements sur
la hauteur par la vue, ou des sensations motrices (au sens
descendant), des variations de température, de pression de
quantité d'oxygène. De la respiration, la sensation
est modifiée. Mais ceci est bien vu.

Certains animaux éprouvent cette variation (poissons, oiseaux)
chez les oiseaux, la facilité du vol dépend de la hauteur:
qu'un oiseau est très haut, la résistance est moins forte, mais
il a un coût + moins efficace. On a trouvé chez les oiseaux
l'organe "Vikhi", vesicule viscérale, qui peut être perçue
le repérage (de l'air chez les chauves-souris)

BnF
MSS

chez les pentéactes marins : le volume d'air accumulé
un volume variable, c'est le niveau, de manière qu'il
ait la même densité que l'eau. si on met sur charge
à l'air Tortue, le volume d'air de ces poumons ~~diminue~~ ^{augmente}.

chez la poisson : l'air est l'air nautique, l'air est
rempli d'oxygène emprunté au sang. si on augmente
la surcharge de poisson, l'air augmente. qd le poisson
descend, la pression augmente l'air diminue, et le poisson
descend + vite. Inversement qd il monte. On a appris des
poissons à venir chercher des vers, à la moindre variation
de pression⁽¹⁾ ! chez le vairon, il y a l'air d'oreille qui
est l'oreille nautique et la vessie nautique : rien près
le vairon de cette chose, il n'est + sensible que aux
variations de 40 mm d'eau.

->

Il faut des repères d'orientation g^éo.
Les anguilles retrouvent le lieu du (mer des sargasses).
Par les animaux terrestres, il y a des lieux de nid, et les
animaux qui reviennent y reviennent; l'orientation "d'homme
centrique" (homing).

que les éléments fument le cerce.

1. Repère nautique

2. Repère sur le chemin, qui permet de le demander
à l'animal (le lieu du contour). il y a l'enregistrement
mnémonique de données visuelles, olfactives, acoustiques

(1) pression de 5 mm. d'eau

(on a vu des poissons se troubler
des courants)