

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_039 | Freud. Sexualité. Folie. \(Cours de Vincennes\).CollectionBoite_039-5-chem | Connaissance de l'espèce. Item](#)[\[La connaissance de l'espèce. suite\]](#)

[La connaissance de l'espèce. suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0135

SourceBoite_039-5-chem | Connaissance de l'espèce.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Le rôle récepteur grâce à la modification très spéciale
 le niveau musculaire repère le hémisphère
 latéral. Le mécanisme n'est pas celui
 de la peau complète. (Paisceaux de Kühn)

134

extr. tendineux



À l'intérieur du tendon, il y a des appareils qui
 cristallisent en modification de la tendinite: ce sont des
 éléments mis en état (des ondes nerveuses). Ce
 sont les appareils de Golgi. Ils sont
 très semblables aux appareils de Ruffini
 que l'on trouve dans l'hypodermis. Les appareils / sont renfermés
 en étiologie (de la peau ou du tendon).



- Les archéolites: un type ~~de~~ de récepteurs (Golgi-
 Mazzoni; Vater-Bacini)

quelques uns en donnant l'orientation

3 séries: 1. muséothèses (sens des muscles)

2. stathèses (sens des attitudes)

3. dynaméthèses (sens des efforts et des contractions)

BnF
MSS

patterns: diff. des
 et distribution des
 et des fibres
 formation d'un
 point fort de l'archéolite

- Au p. de vue de la stathésie, quelle est la limite des
 appréciations. Sa sensibilité est en fait de la région du
 poignet et de l'avant bras: on peut reconnaître du 1/4
 de position ou retrouver 1 position donnée en bandant
 le bras (erreurs de 2 ou 3 degrés). On a vu (typ. intro
 1960), aujourd'hui qui empêche de reconnaître la position

ou se percent à l'encre (en miroir de haut-bras). Ceci dépend de la ^{position} du corps. Peut pr ce motif qu'on arrive à acquiescer des perceptions spatiales stables.

4	1
7	5

Il faut l'eff. des mvt. donc nous avons des stimulations statiques, il faut en acquiescer l'eff. dynamique: le statique suscite le dynamique.

eff. ^{de} connaissance des mvt. ?

11) La connaissance proprioceptive.

Devenir intimement les muscles, les tendons, et les articulations. Peut en que se trouvent les récepteurs proprioceptifs.

Les appareils récepteurs:

1. des muscles ① enveloppes conjonctives où se trouvent

des corpuscules implantés à sup de la peau

- corpuscules de Vater et Pacini -

Adrien ont montré que corpuscules crées.

pour à une impression de pression. L'excit-

ration peut être légère (pression continue) - se

sont ceux qui donnent des impressions tactiles profondes

- corpuscules qui existent dans l'enveloppe des fibres

nerveuses sont entortillés: ce sont les corpus-

cules de Golgi - Mazzoni on en trouve

dans les enveloppes musculaires

② libres muscles qui sont

