

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_039 | Freud. Sexualité. Folie. \(Cours de Vincennes\).CollectionBoite_039-5-chem | Connaissance de l'espèce. Item](#)[\[La connaissance de l'espèce. suite\]](#)

[La connaissance de l'espèce. suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0137

SourceBoite_039-5-chem | Connaissance de l'espèce.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

maché mi gon (on perçoit l'aspect très léger et ovoïde,
 un hôte du Brachi mlu angles).

136

on est capable de détecter 1 mm de $1/2$ millimètre;
 on est capable d'apprécier des variations d'écarts en mm
 le pouce est l'indice ($\frac{15}{1000}$ de millimètre) - On peut apprécier
 1 déplacement angulaire de 5 ou 6° d'angle.

La localisation relative. (à partir d'une direction: l'axe)

Il faut la création d'un schéma corporel et la localisation
 des objets par rapport au corps. On distingue le haut et le
 bas, et devant et derrière, et aussi de l'hétérogénéité
 du corps. ~~La 3^{ème} dimension est + difficile à acquiescer~~
 et l'angle: ~~se~~ du haut du bas et du gauche, pour
 l'hétérogénéité. (allochirid: contact droit, pied à gauche)
 d'équilibre et la tête animale

A. Invertébrés.

Par la sensation de la pesanteur, il y a des organes
 spécifiques les statocystes - il y en a plusieurs types

- 1 type fil à plomb (morceau de fil qui se tient en équilibre sur un point)
- 2 type metronome (baguette avec charge en hauteur)
- 3 boue creuse avec masse mobile (entier ou pièce)




des 3 types chez les céphalopodes nageurs.

(2100)

BnF
MSS


Re 3 ^{type} chez les Crustacés : chez les crevettes
 les particules sont introduites par l'animal après un traitement
 par + part du temps elles sont secrétées par l'animal. (certaines)
 chez les crustacés, les mollusques nauséux, etc. (certaines)
 chez les Cephalopodes, appareil + complexe - chez la
 seiche, il y a 1 statolithe ^{repose sur 1 myo. ou 2} cellules sensibles :
 de petites poutres + denses reposent sur 1 2^{de} maille
 Chez les vertébrés : poissons statolithe sur cellules

cilices d'origine
mouvent



pleuronecte

Chez le poisson le
statolithe paraît
lié; il est à la base





raion

sur le support

B) Chez les vertébrés, il y a 1 cavité, appelée
utricule avec 1 statolithe reposant sur 1 muscle
 (muscle de cellule utriculaire). Il y a 2^{de} appareil, qui
 est le sacculé (perpendiculaire à l'utricule)

la membrane
 utriculaire
 fait un angle
 large de 170°
 elle est contractée
 vers 55°
 la cellule utriculaire
 fait un angle
 large de 55°
 elle est contractée
 vers 15° sur la verticale



les 2 composants
 du manteau
 chez ch. de chat, le
 statolithe est 1 poutre de
 statocome. chez ch.
 il est rempli de 1 coquille
 n'a queue.

Chez ch. le sacculé a 2 ^{mm} de diamètre; utricule = ovoïde de 2 ^{mm} / 3