

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_039 | Freud. Sexualité. Folie. \(Cours de Vincennes\).CollectionBoite_039-5-chem | Connaissance de l'espèce. Item](#)[\[La connaissance de l'espèce. suite\]](#)

[La connaissance de l'espèce. suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0145

SourceBoite_039-5-chem | Connaissance de l'espèce.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

17
valeur des ommatidiens de 120 " à 40" ~~de l'axe~~
de l'axe est 100 / on mesure que celle de l'h. Mais $\sim 2^{1/5}$
elle n'est aussi (un peu au-delà du résolutif) que l'h. est $2^{1/5}$.

Donc Verhulff a ~~présenté~~ en images que se trouvent
voir l'axe qui a 1 mm résolutif de 60" (ou l'h.
7"). Pas de relation de l'ommatidium entre les différents
récepteurs (ou de cell. amacres)


144

P'acuité : le mot recouvre 1 certain cre de fonctions

① le minimum visible : quelle est la dimension angulaire
qui permet de voir ^{rouge} noirs sur / sur ou blancs ou noirs.
ou quelque chose par rapport à un champ de vision. Par le
e lumineux, ou de diamètre minimum ; est une question
d'intensité.

Le minimum visible dépend de l'accommodation et de
la luminosité du champ d'observation.

② le minimum séparable : pour 2 blancs et noirs, c'est bien
différent de la min. visible, mais pas trop. (pour 2 lignes
qui se rapprochent, c'est la même chose ; pour 2 qui se rapprochent
c'est 2 choses différentes). Il est + difficile de distinguer
2 points que d'en avoir 1 (cf. par le toucher). BnF MSS

③ le minimum d'allongement (ou l'axe), de déplacement (ou l'axe),
de déplacement / 2 lignes, mais elles en ligne droite : c'est là
que se trouve la sensibilité la plus grande
on mesure l'acuité avec des optotypes (lettres -
une avec interruption)  ou l'axe de
(i.e. anneau de Randolph)  1.1 #

qd a 5 mètres en bord/ l'éclair de 45. cette acuité a lieu m 70 à 75% des gens. Mais la moyenne est élevée, d'acuité mesurée avec P 50

Bordier	6-7 ans	=	1, 14
	14-15 ans	:	1, 70
	17-20	:	1, 65
	25-30	:	1, 10
	60 ans	:	0, 83
	80 ans	:	0, 55

cette acuité est fonction de l'éclair

d'acuité croît avec l'éclair

(Courbes de Hecht)

Schlaer: les courbes sont en fait des courbes et il y a des irrégularités
~~Hecht~~ - Pour Hecht, c'est la courbe en courbes

Il y a des imperfections lumineuses. Y. de grand
 à éliminer le du/mb, en faisant passer l'image
 par le centre: les courbes de Hecht n'ont pas
 de courbes

Retourner à "l'intensité suprême en lumière"

et montrer que l'éclair n'est que par contraste
 et l'est appelé, sensibilité différentielle. qd le contraste
 augmente, l'acuité croît. Pour l'éclair, la courbe,
 le contraste plus moins que pour la/mb.