

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_039 | Freud. Sexualité. Folie. \(Cours de Vincennes\).CollectionBoite_039-5-chem | Connaissance de l'espèce. Item](#)[\[La connaissance de l'espèce. suite\]](#)

[La connaissance de l'espèce. suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0151

SourceBoite_039-5-chem | Connaissance de l'espèce.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).


Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Achivité motrice de l'accommodation oculaire.

150

Il y a des muscles qui unissent tout et meuvent le globe oculaire ; 6 muscles pr l'œil. Innervation

Les centres moteurs sont occipitaux. Les muscles 2 yeux sont coordonnés, par des centres coordonneurs. Des certaines lésions, il y a l'paraly. d't un ou l'autre du regard (par ex regarder à gauche) à cause de la destruction des centres coordonneurs. Il y a l'union pr les muscles convergens



De la déviation de l'œil, il y a pr la gyration ; la position est telle que l'œil n'a pr de rotation.

(ce sont les lois de Donders). Il y a l'et l'isting

pr la rotation du globe oculaire, mais une rotation autour d'un axe verticale et bascule autour d'un axe transverse.

Pr l'un/ de certains cas, il y a l'certain rotation de l'œil. (qd on regarde en h's et de p'd, il y a rotation ; l'et l'isting a montré que pr l'orte convergens, il y a l'rotation de 8 à 10°) De un qd on incline l'œil en l'ote, il y a l'rotation pr les yeux à cerner leur verticalité.

Il y a l'hiérarchie de solidarité des muscles : qd l'un muscle l'ie, l'autre agit pr le relâche pr l'ail l'ail (pr que l'œil ne sort pas de l'orbite). Très précise graduation pr que il y a l'les échecs dans le suivi du regard

BnF
MSS

il faut que l'activité du muscle soit très intense. Il y a
2.600 à 3.500 fibres du nerf moteur ; c/ il y a à peu près
une fibre de fibres du muscle, il y a 1 fibre nerveuse par
fibre musculaire ; il y a le nombre de fibres (2000)
de la pathétique et de la 8^e oblique. D'où possibilité
de gradation = /m.

Il est à peu près impossible d'avoir des muscles d'vergence
et il y a une petite marge de divergence possible : on place
1 prisme devant le regard, et on écarte l'7 des yeux ;
on se redonne parallèles, les yeux peuvent diverger
(2 à 4° par chaque œil). On peut également compenser
des différences de hauteur. Il y a quelques mots de vocabulaire
qui sont très parallèles ^{2 lignes} et est verticale et
l'autre est en fait (ce vocabulaire est fait - un
texte peut atteindre de 4 à 14° : on a des écartements ;
la convergence a de 4 à 8°), ou pour suivre 1 image
verticale qui tourne.

La convergence peut varier de 20 à 60°. On
mesure cette convergence en angle métrique (unité :
variation de 1° à 1 m. ; à 50 cm 2 unités), parce que
la même angulation revient suivant l'écartement des
yeux.

Le rôle de la motricité oculaire est capital.
Les explorations volontaires (avec ou sans la regard
prohibée de l'écouter). 1. Le sifflet provoque une
réflexe (on en est sûr de l'écouter). Seuls les yeux