

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_039 | Freud. Sexualité. Folie. \(Cours de Vincennes\).CollectionBoite_039-6-chem | Autour de Schleiden](#)[ItemSchleiden abandonne sa théorie.](#)

Schleiden abandonne sa théorie.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0174

SourceBoite_039-6-chem | Autour de Schleiden

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

J'ai soumis mes reproches à Schr.
 " Il a argué la certitude de l'existence
 de 2 variables en hypocoïnisation ; et a
 insisté sur le fait que les bases d'adhérence
 de ces variables sont les moles du sac ; il a
 ajouté que le surpenseur correspondait
 à la sac formée à 2 de ces 2 bases
 d'adhérence.

Il nous permet de distinguer, du moins,
 les 2 relations :

Radtkopf. D'out de
 l'union

de la relation rhénos.

(Ann. sc. nat. 4^{re} s. V
 1856.
 248-41

