

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_039 | Freud. Sexualité. Folie. \(Cours de Vincennes\).CollectionBoite_039-6-chem | Autour de Schleiden Item](#)[Les différentes étapes du développement des vésicules embryonnaires. Radlkofer.](#)

Les différentes étapes du développement des vésicules embryonnaires. Radlkofer.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0176

SourceBoite_039-6-chem | Autour de Schleiden

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Radlkofer, Ludwig](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

on peut de voir que le myosin
de embryon est ~~la~~ m le r^ule
du l^utr pollinique, mais le r^ule de
verine embryonnaire m f^r.

La myosine c/4 a venir avant
que le l^utr pollinique soit r^ule
d'ovule.

Radtkefer. Not de
embryo - v. le reg.
Phaner.

(Ann. Jers. nat. 40 sup
V

1856.) n° 234. 247