

Théorie de Schleiden. [suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**b039_f0186**

Source**Boite_039-6-chem | Autour de Schleiden**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Personnes citées**[Schleiden, Matthias Jakob](#)**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

184
on voit une très grosse cellule qui a
nomme le sac embryonnaire.

Le pollen modifie un tube qui s'embouche
à la gemmule terminale → sac embryonnaire.
A ce moment là le bout du tube
pollinique est rempli de cellules qui développent
1 plan complet : c'est l'embryon du
genre. La gemmule devient la graine
(56.57)

Schleiden. La plan complet
12 vi. Ind. pr.
1859

une note au dernier § indique que
c'est lui à 2 broches cette fleur de poutre
remplie de substance : mais que on ignore
ce qu'elle fait.



