

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_039 | Freud. Sexualité. Folie. \(Cours de Vincennes\).CollectionBoite_039-6-chem | Autour de Schleiden ItemHistorique de la discussion autour de Schleiden.](#)

Historique de la discussion autour de Schleiden.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0187

SourceBoite_039-6-chem | Autour de Schleiden

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Schleiden, Matthias Jakob](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Histoire de la discussion autour de 185
Schleiden

- la thèse de Schleiden fut adoptée
Widder (noté sur les Scrophulariées et
sur le Santalum album - 1835)

Geleznoff (noté sur le Persica utyari,
et le Larix)

Tutaine (noté sur la Veronica); mais
il lui ni Geleznoff n'adhèrent les
concl. de Schleiden sur la sexualité.

Meyer (noté sur le Fritillaria et le Arabis).



- En 1842, ~~Amici~~ sur le Courge, et
en 46 sur un Orchis, Amici reconnut
qu'il y avait de la sac embryonnaire, et
avait les caractères du tube pollinique, ~~et~~
une ou plusieurs cellules germinatives; et
que p. l. de celle-ci se développe un embryon
longue le tube pollinique, sans pénétrer
le sac embryonnaire, décrit sur lui.

Herbert-Girard, Hugo Mohl (en 1847,

sur Porchi (Morio) avec l'inventeur de l'hist
d'Amici.

Ho fucileto sur le canna voit le tube
potlinique pini hivi de sue embryonnaire;
mais on se trompe ne se confond ni
avec l'embryon qui provient de vésicule
antérieure du tube. (1849)

Unger est de l'avis d'Amici (49)

- Telesno rapporte en 49 la théorie
qui est aujourd'hui admise jusqu'à présent. Mais il
n'admet pas une méformisme de la vésicule
embryonnaire; il pense à un mélange
de substances. §

- Schuchl soutient la théorie de
Schleiden.

- il pense qu'il faut avoir de l'innocence
à microscope (à que Telesno seul a
fait)

- que le ~~libre~~ supérieur est un résidu
de tube potlinique.