

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_039 | Freud. Sexualité. Folie. \(Cours de Vincennes\).CollectionBoite_039-6-chem | Autour de Schleiden](#)[ItemSchleiden. Le tube pollinique et l'ovule.](#)

Schleiden. Le tube pollinique et l'ovule.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0193

SourceBoite_039-6-chem | Autour de Schleiden

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Schleiden, Matthias Jakob](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

191

Schleiden. Le tube pollinique et l'ovule.

- Le tube pollinique s'étend $\rightarrow$ placenta de l'ovule. Là, il pénètre le microcyte, brève le sommet du nucleus en suivant la visière à l'extrémité s'enfonçant dans l'embryon.

- Le tube pollinique pour servir à la formation du sac embryonnaire, se replie en dedans à son tour de l'ovule, et son extrémité pénètre à l'intérieur du sac embryonnaire.

- L'extrémité du t. p. pénètre dans le sac embryonnaire, se gonfle en forme sphérique ou ovoïde, et son contenu se change en tissu cellulaire. Elle produit les organes latéraux, 1 ou 2 cotylédons, mais l'extrémité primitive, formant le plumule en restant distincte.

- La partie du t. p. située au-dessous du sac embryonnaire et qui s'étend et se divise, lui



181
du sac embryonnaire, oblitéré, de
sorte que l'embryon affecte un contour
du type embryonnaire."

134

Schneider. Sur la formation
de l'ovule et l'origine de l'embryon
de la Pharerosome.

Ann. de sc. nat. 1836
2^e série. XXI

Schneider a vu le contour que
le noyau, par de l'embryon, affecte vers l'origine
cellulaire, qui est un y + un m 2 vers de la
plaque. (cf. Wyder, hch).