

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_039 | Freud. Sexualité. Folie. \(Cours de Vincennes\).CollectionBoite_039-9-chem | Variations Item](#)[Les différents types de variations. Y. Delage.](#)

Les différents types de variations. Y. Delage.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0233

SourceBoite_039-9-chem | Variations

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Delage, Yves](#)

Références bibliographiques[Delage, L'Hérédité et les grands problèmes de la biologie générale](#)

Référentiel BNF<https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30312713v>

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Données de data.bnf.fr

AUTEUR : Delage, Yves (1854-05-13 -- 1854-05-13)

TITRE L'Hérédité et les grands problèmes de la biologie générale, par Yves Delage,... 2e édition, revue...

LIEU DE PUBLICATION Paris

DATE 1903

EDITEUR Paris : Schleicher frères , 1903

Les différents types de vanishing 231
Y. De Pege.

1. Les vanishing individuels.

Spécies peu nombreux qui n'ont pas de vanishing individuel. Ce sont les miens qui sont les plus courants.

Il existe que 1 moitié du corps humain mort ou en état (vanishing universelle qui se trouve chez le million plat)

2. Les vanishing combinés.

Il y a tout un groupe d'effets de vanishing :

• vanishing supplémentaires d'origine qui sont très voisins en hypothèse. (par ex l'antithorax chez le mouton ; l'ant et chevrons chez l'âne).

BnF
MSS

• vanishing de 2 parties distinctes.

• par cyclopie décrite par Daroué.

• type de vanishing de la variété cervinale.

• des saupards et des os (cavités orbitales).

• aussi le exemple de Baldos. ainsi

en million, plus les lieux existent
de stylus ; mais aussi à nager
dans ~~qui~~ dans la mer qui
la baigne, mais elle a tendance
à développer une certaine forme
de plaisir \rightarrow , mais quei elle comprend
 \rightarrow l'heure de son plaisir \rightarrow huit.

3. Variétés possibles.

- Il existe que des individus d'Henrich.
Il y a des variations possibles / par
exemple le melon, et c'est d'autre chose.
Il existe donc des variétés qui sont "renommées" +
que des individus de marie.
- Des + maries, il peut y avoir des variations :
nous connaissons des maries qui sont
variétés (lesquels sont renommées, etc.)
Mais
- une variété possède "morphisme"
comme si elle était signifiante