Les grandes épidémies végétales du XIXe siècle.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0247
SourceBoite_039-11-chem | Pratiques agronomiques
LangueFrançais
TypeFicheLecture
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

La grande épidémie végétale du XIXe,

- De 1830 à 45, France, Allemagne, Irlande : Mildiou de la P. de terre. Au bout de quelques années, réunion, due sans doute à l'utilisation de variétés moins sensibles

Après que de Bary ait identifié le parasite (Phytophthora infestans) en 76, et après l'emploi de sels de cuivre chez la vigne, on institue la p. ctf.

- Pr les vignes : oïdium en 1845, Phylloxera en 65, Mildiou 78, Black-rot 85.

Le Phylloxera est apporté par des plants vivants qu'on fait venir pour qu'ils soient résistants à l'oïdium ; et on a le mildiou.

BnF MSS

~~Oïdium~~

- La grande recherche de plants

renvoient tout deux à Millardet,
Planchon, Viala.

G. Viennot Bourgin.
in Dons de Virville.
Histoire des Bolz.
pp 290-296.

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/596?context=pdf