

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_007 | Onanisme. Perfectionnement de l'espèce. Police médicale allemande et anglaise.CollectionBoite_007-7-chem | Santé des enfants. Pouvoir médical. ItemFonssagrives. Livret maternel pour prendre des notes sur la santé des enfants, 1869 \[photocopie\]](#)

Fonssagrives. Livret maternel pour prendre des notes sur la santé des enfants, 1869 [photocopie]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb007_f0352

SourceBoite_007-7-chem | Santé des enfants. Pouvoir médical.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Fonssagrives, Jean-Baptiste](#)

Références bibliographiques[Fonssagrives, Livret maternel pour prendre des notes sur la santé des enfants](#)

Référentiel BNF<https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30446743j>

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Données de data.bnf.fr

AUTEUR : Fonssagrives, Jean-Baptiste (1823-03-14 -- 1823-03-14)

TITRE

Livret maternel pour prendre des notes sur la santé des enfants...

LIEU DE PUBLICATION Paris

DATE 1869

EDITEUR Paris : Hachette , 1869

VACCINE

11

(La vaccine soigneusement pratiquée est dépourvue de tout inconvénient. Ne pas faire vacciner ses enfants, c'est commettre à leur égard un grave sévices. Ne pas les revacciner, c'est leur faire courir les risques d'une imprudence.)

I. * Age de l'enfant à l'époque de la vaccination :

II. Source du vaccin : $\left\{ \begin{array}{l} \text{A. Bras à bras :} \\ \text{B. V. sur place :} \\ \text{C. V. animal :} \end{array} \right.$

III. Partie du corps où la vaccine a été pratiquée :

IV. Nombre de piqûres : $\left\{ \begin{array}{l} \text{A. Pratiquées :} \\ \text{B. Ayant donné des boutons :} \end{array} \right.$

V. Durée de l'éruption : †

VI. Qualité de la vaccine : ‡

VII. Époque de la revaccination : ||

VIII. Constatation de ses effets :

* Il faut vacciner le plus tôt possible, dès les premiers jours en temps d'épidémie de petite-vérole. En temps ordinaire, on doit vacciner avant le travail de dentition, vers quatre ou cinq mois. Si l'on est en retard et qu'aucune épidémie ne presse, choisir une période de repos pour les dents.

† Depuis le moment où la piqûre s'irrite jusqu'au moment où les boutons sèchent.

‡ Période d'inertie locale de trois à quatre jours ; — période d'élevure enflammée vers le quatrième jour, — pustule le septième, — achèvement de la pustule, le huitième, le neuvième, le dixième et le onzième jour ; — période de dessiccation le douzième jour ; — détachement de la croûte du vingt-quatrième au vingt-neuvième jour. — Se défier de la vertu préservatrice des boutons qui se développent très-rapidement. En tout cas, faire toujours constater par un médecin la marche de la vaccination.

|| L'utilité de la revaccination est hors de doute, et cette pratique doit se généraliser. C'est vers douze à treize ans qu'il faut faire revacciner ses enfants.



Réserve à l'usage privé - Lot n° 57.298 du 11.3.1957

