

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_038 | Rue d'Ulm, circa 1944-1950.CollectionBoite_038-16-chem | Monakow. Item](#)[La Diaschise de von Monakow](#)

La Diaschise de von Monakow

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb038_f0434

SourceBoite_038-16-chem | Monakow.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Monakow, Constantin von](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

La Diaschise de von Monakow

- Obs. courante : lésion du SN provoque
 - des symptômes temporaires
 - des symptômes résiduels
- On avait l'habitude
 - de ne rapporter direct^{mt} à la lésion en foyer que les symptômes résiduels
 - d'attribuer les symptômes temporaires à des processus d'expansion et résorption du sang hémorragique, œdème cérébral, choc traumatique.
- Si le nom de Diaschise, v. Monakow a défini 1 processus d'inhibition :
 - ne se propageant ni d façon diffuse
 - mais se propageant conformément à l'organisation synaptique des neurones, le long des voies de projection et d'association

Cette électivité de la propagation de l'inhibition correspond aux éditions d'excitabilité des neurones.
- De : la diaschise atteint tous les éléments affectés collaborer à l'un fonction, mais

BnF
MSS

elle en atteint d'autres + qu'ils sont
+ dépendent les 1 des autres, moins
capables d'1 fonction^{ne} autonome