

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_038 | Rue d'Ulm, circa 1944-1950.CollectionBoite_038-18-chem | Alexander Item](#)[Les psychonévroses selon Alexander](#)

Les psychonévroses selon Alexander

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb038_f0454

SourceBoite_038-18-chem | Alexander

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Alexander, Franz Gabriel](#)

Références bibliographiques[Alexander, Psychoanalytic Therapy. Principles and Application, New York, The Ronald Press Company, 1946](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Les psychonévroses 3/ Alexander.

454

1/ Le xan trad. orbi bornu aux cas de névroses chroniques graves, caractérisés par le fait

- qui est associé à l'idée d'enfer
- que les traumatismes ultérieurs et la situation actuelle ne sont que des "precipitating factors"

Or c'est surtout les autres formes : pannes névrotiques aiguës, cas chroniques légers.

2/ De sa forme ca + g + b, la xanrose est "l'échec de l'individu à affronter avec succès 1 situation donnée, 1 échec à trouver 1 gratification sociale acceptable par les besoins subjectifs du caractère donné. Cet échec dépend de l'équilibre entre les capacités d'adaptation de l'ego et la difficulté du pb à affronter."

Cet équilibre est troublé et perturbé, sous l'inspiration, en partie en l'absence de la réalité.

BnF
MSS

3 / Il y a 3 groupes de névroses:

A Groupe 1 : cas chroniques avec symptomatologie psychotique, avec des symptômes psychotiques qui se développent dans les circonstances de la vie quotidienne. Les patients institutionnels et hospitalisés ont des troubles les plus importants.

B Groupe 2 : cas de conversion : dépression, obsession, névrose de caractère, d'angoisse, de conversion. Aux patients institutionnels et hospitalisés, ils ont des troubles traumatiques de la personnalité.

C Groupe 3 : troubles neurotiques chez des individus auparavant bien ajustés, mais soumis des conditions traumatiques. Facteurs institutionnels et hospitalisés ont très peu d'importance (Ex: névroses de guerre)

On trouve à peu près cette répartition des troubles à la xénopsychiatrie ; la xénopsychiatrie ne s'attache qu'au groupe 2.

Alexander. (Xenopsychiatrie)
H 7-10)