Les seuils de fusion et l’a.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb038_f0489
SourceBoite_038-22-chem | La S.L.I. [Stimulation Lumineuse Intermittente ?]
LangueFrançais
TypeFicheLecture
RelationNumérisation d’un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l’autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l’Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Les seuils de fusion et C.A. 489

Il n'y a pas moyen de trouver 1 relation simple entre le rythme α et la fréq.ce critique de fusion à laquelle le flicker cesse à apparaître discontinu.

En effet les seuils de fusion varient selon les différentes portions du champ visuel =

- les seuils de fusion sont en gal + bas à la périphérie
- et il y a 1 gradient ascendant vers le centre de fixation

Or C.A. est le même sur tt le lobe occipital.

Teuber in Stroud
(Psychological moment in ~~[illegible]~~ perception)
J. Macy. conf. les VIth. pp 51-52

BnF MSS

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/6682?context=pdf

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/6682?context=pdf