

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_038 | Rue d'Ulm, circa 1944-1950.CollectionBoite_038-22-chem | La S.L.I. \[Stimulation Lumineuse Intermittente ?\]](#) Item[[Les ondes cérébrales et le flichner - suite](#)]

[Les ondes cérébrales et le flichner - suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb038_f0492

SourceBoite_038-22-chem | La S.L.I. [Stimulation Lumineuse Intermittente ?]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

La réaction du triggering-signal peut être
fautive la base de l'amplitude, de la focalisation,
de la fréquence; et au lieu d'être le signal et
le flash on peut échanger entre 1 sec et 100
millisecondes. D'ici à la gamme de 492
réactions possibles entre le flash et les
autres circuits.

50 % des sujets adultes, jeunes et nés,
à la 1^{re} exposition au flash-écran / flasher,
présentent des décharges paroxystiques du type
de celle qui on voit de l'épilepsie.

Cette réponse disparaît qd on prolonge l'exposi-
tion, sauf chez les 3 ou 4 % qui ont une
fièvre.

6 / Le flasher provoque souvent des tétanis-
mes (surtout en yeux fermés, et avec des
fréquences entre 8 et 25 c/s.); à certaines fréquences
(autour de 10) certains sujets ont des spasmes
qui tournent, des explosions. BnF
MSS

- avec l'usage du stroboscope, on a pu voir
que l'effet était dû au mouvement de la roue qui
tournait. Dès le stroboscope, il y a une dé-
viation du h₂ en face de la spirale; mais ce
flash ne dure que ~~2~~ 20 millionièmes de
seconde, et que l'effet est instantané in l'air que
la lumière est + diffuse.

- ce + suppose que c'est la lumière: mais

le électrokinograme ne montre aucun effet

de saturation que :

- lorsque la sensation influence en premier lieu l'aspect, le changement électrique se produit et s'agit de projection visuelle.
- lorsque la sensation vient ensuite, la réponse est ~~la~~ la région de projection corporelle.

Le mouvement de la cortex, et précis du scanning effectué par la cortex

Lining Enin (H 58.69)