

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_038 | Rue d'Ulm, circa 1944-1950.CollectionBoite_038-22-chem | La S.L.I. \[Stimulation Lumineuse Intermittente ?\]](#)[ItemPhysiologie de la S. L. I.](#)

Physiologie de la S. L. I.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb038_f0493

SourceBoite_038-22-chem | La S.L.I. [Stimulation Lumineuse Intermittente ?]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

- Le flicher induit le rythme en Hz 8 et 18 c/s.
- Au repos, la réponse tend à tomber à la $\frac{1}{2}$ de la fréquence de flicher.

- Adrian en 1947 a montré que la réponse est induite par l'air forte nouvelle réception de l'air 17 : ceci :

- en stimulant la moitié d'un gauche du champ visuel qd l'amplitude de l'a est + gd du côté opposé.

- en stimulant l'hémi du l'oeil de champ visuel qd la + gde amplitude de l'a est en l'oeil un l'oeil de la région occipitale.

- Livonoff (1940) a montré que l'oeil se soumet continuellement à la fréquence ; mais qd il y a un écart en Hz 5 et 10 %, il y a un saut.

Il y a interférence les voies afférentes et rythmiques, et de l'activité locale de l'oeil strié.



Whitridge. (EEG-
W118)

