

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite\\_038 | Rue d'Ulm, circa 1944-1950.CollectionBoite\\_038-22-chem | La S.L.I. \[Stimulation Lumineuse Intermittente ?\]](#) [ItemEffets psychophysio\[logiques\] de la S. L. I.](#)

## Effets psychophysio[logiques] de la S. L. I.

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Coteb038\_f0495

SourceBoite\_038-22-chem | La S.L.I. [Stimulation Lumineuse Intermittente ?]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).  
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

---

A. Sur le sujet normal

1 Effet psychologiques

Les yeux fermés le sujet voit souvent 1  
anneau rouge entourant de carrés ou de losanges,  
~~ainsi et d'autres~~, disposés en 4 cadrans.

- cette image est statique et incolore  
or les frises stimulatoires ne provoquant  
que de petites réponses EEC ; et sans sur-  
charge affective.

- or les frises entraînant les réponses EEC  
maximales, on trouve

(a) 1 composante cinétique: les  
illusions géom. se déplacent radialement  
du centre vers la périphérie ou dans un arc  
de cercle concentrique ou hélicoïdal\* (centrifuge)

(b) 1 composante chromatique: les  
images sont colorées en rouge, en jaune,  
+ rarement en bleu; parfois impression  
en noir et blanc au centre.

(c) 1 composante affective: sensations



de ma prise représentant parfois les  
équivalents mineurs de l'angoisse mor-  
bide.

(chez le nourrisson, sensation agressive puis  
qui ne peut bien venir que d'une source la SLE)

## 2/ Effet EEG

a/ Effet primaires (sur les aires de projection  
spécifique)

- de latence (50 à 70 msec après l'ectair)
- forme complexe: 1 onde rapide tri-  
phasique initiale positive, suivie d'onde  
lente diphasique initiale négative.

- amplitude variable, qui dépend:

① de l'importance de l'activité spontanée de  
fond, qui peut renforcer ou masquer les complexes  
s/ que 'il tombe ou non en phase avec lui

② de la fréquence de répétition des ectairs: q'elle  
comprise entre 10 et 25 cps, elle augmente  
l'importance de la réponse.

③ du nombre d'ectairs continus et de la stimulation  
partielle, l'amplitude  $\nearrow$  avec le nombre des  
ectairs, mais ne dépassant jamais  $\pm$