

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[Collection Boite_038 | Rue d'Ulm, circa 1944-1950.](#)[Collection Boite_038-22-chem | La S.L.I. \[Stimulation Lumineuse Intermittente ?\]](#)[Item](#)[\[Effets psychophysiologiques de la S. L. I. - suite\]](#)

[Effets psychophysiologiques de la S. L. I. - suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb038_f0496

SourceBoite_038-22-chem | La S.L.I. [Stimulation Lumineuse Intermittente ?]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

on a l'habitude d'appeler ça la "stimulation". En réa. p. la réponse rythm. marquée par la SLI doit être considérée l'irréversibilité de l'effet électrique dans le tissu. Mais la réponse peut cependant être à moins de l'accident.

- la fréq. est 2 ou 3 fois celle du stimulus.

- 1 ms (voltage, température)

- on bien à répondu sur 2 appareils
(~~plus~~ d'un appareil)

b) Effets secondaires (fonction du circuit sper.)

Région temporale: fréq. de 5/7 ms : forme un rythme régulier et assez sinusoidal. suit le rythme Q; il accompagné un rythme humide de l'urètre et l'aggrava.

BnF
MSS

B) Effets sur le sujet à affections partielles.

Supposons au sujet à des "crises" psychotiques, neuro-psychiques.

- Effets γ: En premier lieu, la péri-

qui prend une couleur dynamique et chromatique très marquée. Parfois il existe un quasi hallucinatoire ("yeux", "crânes", etc.) d'imperméables.

2/ Effet affectif intense (\leftrightarrow angoisse) et effet vegetatif (pâleur, éruption cutanée, rapports avec la respiration).

3/ Effet EEG: un potentiel circadien + ample, + facile à observer. Le Q est + marqué, en y est崩壊: pr/vis caractérisant ou proche de l'extinction.

Il manque, «la moitié de difficultés affectives qui devraient perdre place, chute mortelle, moribundie de l'organisme ni énurésie. sur le bout de repos ou trouve de la régularité moyenne des tracés de Q avec un rapport de 4 c/s. -

La SLI, au niveau de 4-6 sp./sec. provoque un état banal, sans réaction émotionnelle. Pr ? freq. entre 4 et 6 décharge Q de très grande amplitude, et de freq. correspondante, avec tout d'abord un arrêt. Pr 8 et 9 sec, l'amplitude diminue et le taux d'angulations tend à diminuer.