

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_038 | Rue d'Ulm, circa 1944-1950.CollectionBoite_038-22-chem | La S.L.I. \[Stimulation Lumineuse Intermittente ?\]](#) [Item](#)[Effets sur les sujets épileptiques](#)

Effets sur les sujets épileptiques

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb038_f0497

SourceBoite_038-22-chem | La S.L.I. [Stimulation Lumineuse Intermittente ?]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

§ Effet sur les sujets épileptiques 497

Les effets γ sont souvent aussi intenses que ceux primitifs par les hyper/hypermiques.

Les effets sont caractéristiques :

- au α de me végétatif : un quercus en hyperth.

- au α de me de l'axe de relation : recense-
ment musculaire biphasique en / l'axe, soit
généraliser soit prédominant au niveau des
pupilles, de la po, au du ventre sup^r.

ou myoclonus succédant à chaque éclair
ou à 1 éclair sur 2 ou 3. L'efficacité
maximale à 15 e/sec..

Les effets $E \rightarrow C$.

La ref. primaire occ. pôle ou 2^e plan
donne la ref. "irradiée", sur H frontales

- la ref. fr ont 1 gde amplitude : +ieurs
centimes de microvolt

- la forme est fr et la du volume est
érogée ; mais la situation par rapport à
la ligne de base est devenue imprécise,
il y a succession de points en reg. suivis d'ondes
un peu de no signe.

Stim. physio

on peut expliquer les réactions électriques
frontales, les vomissements bulbaire et les myoclo-
nies, si on y a recours l'axonal général
à voie optique par l'axe définie de la
rétine

- au cortex occ. par l'axonal général
- au tronc mésencéphalique par
la reg. réflexe.

On sait aussi que le cardiazol provoquait
avec la SLI, des réponses myoclon. ~~au tronc~~
et frontales, et myoclon. normaux. Goshkin
et Hunter ont montré expérimentalement sur
des animaux a montré la présence sur
le tronc rétinogéniculocortical. L'absence
dans le thalamus voisin et de la
aux régions corticales.

D'autres par G. et H. ont montré
qu'il n'y avait pas de liaison directe
cortex occipital au cortex frontal : l'absence
de la région occipitale n'empêche pas les
réponses frontales.

- d'autre côté cette liaison thalamo-
corticale peut être supprimée par l'ectomie.