L’ EEG [Electroencéphalographie] et la manie depressive

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb038_f0504
SourceBoite_038-23-chem | L’EEG [Électro-encéphalogramme ?] et la pathologie.
LangueFrançais
TypeFicheLecture
Personnes citéesLindsley
RelationNumérisation d’un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l’autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l’Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

L'EEG et la manie-dépression.

- Lemere (36, 39, 41) : l'EEG des M.D. a + a forte, rythmique, sans ondes lentes + perturbés qui présentent du ∑. Il a trouvé cela a + sur schizoïdes et + sur cyclothymiques qui ont sur achiz

- P. A Davis (1942) : EEG des M.D. présente + a + forte, + régulier et + rythmique que celui des schizo.

- P. A. Davis (1941) note que les M.D.
  ① avec lenteur ~~en période~~ de dépression ont + ou a avec lenteur aux ondes lentes.
  ② avec lenteur à la ~~en période~~ manie ~~pure~~, a ~~plus~~ rapide, moins régulier, mêlé à ① β.
  Mais aucune modification au moment du passage de la manie à la dépression intervient.

Lindsley (in Hunt II. pp 1083. 1084)

BnF MSS

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/6697?context=pdf

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/6697?context=pdf