

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_038 | Rue d'Ulm, circa 1944-1950.CollectionBoite_038-23-chem | L'EEG \[Électro-encéphalogramme ?\] et la pathologie. Item\[La schizophrénie et l'Electroencéphalographie - suite\]](#)

[La schizophrénie et l'Electroencéphalographie - suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb038_f0506

SourceBoite_038-23-chem | L'EEG [Électro-encéphalogramme ?] et la pathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées

- [Jasper, Herbert](#)
- [Lindsley,](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

③) +iper : chez $\frac{1}{4}$ de schizo, il trouve
± activité épileptiforme.

506

chez les schizo, il y a de gds diffé-
rences, et de gds variétés d'anomalies
et ± dissociation d'activité de ces aires homo-
logues, ± faible régulation de la fréq-
et des hautes des ondes Δ de type épilep-
tique.

- Davin et Davin (1939) ne trouvent pas
de diffé- significative et l'index entre
les schizo et le M.D. - Arthur P.A. Davin
(40 et 42) caractérise P Δ Δ Δ du schizo
et "choppy", et irrégulier avec tendance aux
ondes rapides, irrégulières.

- Finley et Campbell (1941) : ± + g d
pourcentage de traces anormales au la-
pencil (sur ± population de 500 schizo et
de 215 n^x). Le pourcentage de + élevée se
trouve chez le groupe Eulatonique. W'érifia-

Lindsley. (in H. H. T. II)
1081-1083



