L’ EEG [Electroencéphalographie] et le bégaiement

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb038_f0512
SourceBoite_038-23-chem | L’EEG [Électro-encéphalogramme ?] et la pathologie.
LangueFrançais
TypeFicheLecture
Personnes citéesHill, Denis
RelationNumérisation d’un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l’autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l’Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

L'EEG et le bégaiement.

Etudes de Douglass (1943) et de Knott et Tjossen (1943)

Douglass : le blocage de l'α est + marqué durant la parole que durant le silence chez les bègues (alors que ceci n'apparaît pas dans le groupe contrôle)

Pdt le silence, les bègues tendent à montrer 1 + gd blocage de l'α, ds l'aire occipitale gauche. le groupe de contrôle ds l'aire dte. Cette diffce est abolie pdt la parole.

Travis et Knott en 36 ont observé 2 bègues qui avaient des pointes de gde amplitude durant des spasmes toniques sans vocalisation.
(certains bégaiements accidentels mineurs chez l'enfant sont la manifestation clinique d'attaques épileptiques mineures).

Hill (in EEG. 344-345)

BnF MSS

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/6705?context=pdf



Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/6705?context=pdf