

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_038 | Rue d'Ulm, circa 1944-1950.CollectionBoite_038-24-chem | Jackson et le néo-jacksonisme.](#)
[Item\[Évolution et dissociation selon Jackson - suite\]](#)

[Évolution et dissociation selon Jackson - suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb038_f0518

SourceBoite_038-24-chem | Jackson et le néo-jacksonisme.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

sont engagés d'une manière autonome et indépendante
des autres inf.^{rs} (rêverie ; rêve ; sommeil)

La scission ne doit pas être faite entre 518

- activité mentale et activité sensori motrice
- maintenir activités sensori motrices
 - qui mobilisent les seuls centres sup.^{rs}
 - et celles qui mobilisent conjointement les centres moyens et inf.^{rs}

D. Dissolution

"des maladies du S.N doivent être considérées
de régression de l'évolution, i.e. c/ des dissolutions"
ce ne sont pas des excisions d'organes, ce sont
des dissolutions de fonctions.

1 La dissolution se fait à partir de + fragile

2 La dissolution présente l'aspect positif et
un aspect négatif :

- aspect nég : suppression des manifestations
d'ordre sup.^r.

- aspect positif : suractivité des ~~centres~~
centres inférieurs.

mais eng.^t la maladie ne rompt pas réactif
à l'état ant.^r de l'évolution ; en effet : →

3 La dissolution peut être uniforme ou
locale

- uniforme: l'ensemble du S.N. subit l'influence nocive (alcool m. ex)
- locale: action nocive sur 1 partie du S.N.

4.5 / En localisation de la lésion, il peut se manifester par des phénomènes de destruction de décharge /

- il y a destruction qd les centres de fonctions sont lésés
- il y a de décharge lorsque la lésion est localisée au voisinage d'un he. elle provoque alors sur lui l'action imitative (comparable à l'action électrique).
ex: crise d'épilepsie partielle.