

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_038 | Rue d'Ulm, circa 1944-1950.CollectionBoite_038-27-chem | Pierre Janet. ItemActions secondaires \[feuille dactylographiée\]](#)

Actions secondaires [feuille dactylographiée]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb038_f0599

SourceBoite_038-27-chem | Pierre Janet.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Références bibliographiques[Janet, De l'angoisse à l'extase. Études sur les croyances et les sentiments, Paris, PUF, 1926-1928](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Alors que les actions primaires répondent aux excitations externes, "d'autres faits ps viennent s'y ajouter sans avoir besoin d'une nouvelle stimulation extérieure; ils apparaissent à la suite ou à propos des premiers.

Les actes secondaires n'ont pas de nature spéciale... des actes quelconques qui auraient pu se produire c/ actions primaires. Tous ces actes ont été ds d'autres circonstances des actes primaires, et c'est m sous forme d'actes primaires qu'ils ont été acquis pr la première fois".

Leur origine:

"C'est une sorte d'action particulière qui s'est élaborée à un certain stade du développement ps, à la fin du stade perceptif avec les réflexes d'équilibre et d'attitude, et surtout au stade socio personnel avec les collaborations sociales. C'est une action qui est faite en réaction à l'acte primaire lui-même, c/ celui-ci était une réaction aux stimulations extérieures.

Sherrington distinguait les réflexes extéroceptifs qui ont pr point de départ une modification à la périphérie du corps et les réflexes proprioceptifs qui ont pr point de départ une modification musculaire ou nerveuse déterminée par les actions primaires elles-mêmes. Ces actes secondaires n'existent pas seulement ds les régulations des mvts et de l'équilibre; ils se présentent à propos des conduites plus complexes.

Si à une question je réponds étourdiment une sottise, c'est l'acte primaire extéroceptif, et si, immédiatement parés je murmure à mon adresse "imbécile" c'est l'acte secondaire proprioceptif!"

Pathologie des actes secondaires:

BnF
MSS.

1) Ce sont eux qui sont supprimés ds le sentiment du vide. Sans dte ce sentiment est lui-même une réaction secondaire; mais il disparaît bientôt et il fait place à l'état de vide.

2) Les malades incapables d'exécuter une certaine action c/ acte secondaire sont parfaitement capables de l'exécuter correctement qd elle se présente ss

une forme primaire.

Ex: Claudine qui éprouve un sentiment de vide devant le pardessus de J. et n'a pas l'idée de le ranger, le fera si je lui demande de se lever et de ranger mon pardessus.

3) Ds le traitement si on peut établir plus ou moins complètement les actes secondaires, on amène la cessation du sentiment du vide.

Ex: "Laetitia, qd. je parviens à l'intéresser à un effet de lumière, aux arbres noirs qui se détachent sur le fond blanc de la neige, remarque que les objets deviennent plus réels.

Angoisse II p.121-125