

Lésions de la gastro-entérite.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb036_f0002

SourceBoite_036-1-chem | Broussais.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Broussais, François-Joseph-Victor](#)

Références bibliographiquesBroussais, Cours de pathologie et de thérapeutique générales, professé à la Faculté de médecine de Paris. Recueilli par un sténographe (M. Tasset), et revu sous les yeux de l'auteur par un médecin de la doctrine physiologique (P.-M. Gaubert), Paris, Mlle Delaunay, (1831-1832)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/08/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Lésions de la gastro-entérite

2

1 sur 1 iléo-colite " avec p^o sur 1 Modeno-
hépatite : rougeur de t^ulomb^u, du
moderum (^{avec} ans de plèvres gonflés) de
p^ont^u avec taches brunes; m^ug^u avec
rougeur et usée. q^uon voit le moderum
est rouillé ulcéré. F^oie jaun. gorge de
sang décolorant au milieu des côles, noir

2 sur 1 iléo-colite, rougeur ^{r 535}
l'ileon, hypertrophie de la muqueuse de l'ileon,
ses follicules muqueux sont a cystomères et
ulcérés; ep^u visible de la muqueuse
du cœcum; ganglions gonflés, ^{n^o 535-6.}

Br. couv de p^otho.

I. 564. 

